

Embarazo ectópico

1

Nos ayuda a hacer diagnóstico diferencial entre aborto y embarazo ectópico:

- a) la duración de la amenorrea
- b) las reacciones de embarazo positivas
- c) la leucocitosis
- d) la anemia
- e) la sedimentación acelerada.

2

Son medidas preventivas para el embarazo ectópico:

- a) evitar infecciones pélvicas con medidas higiénicas
- b) obtener atención obstétrica adecuada
- c) tratamiento oportuno de cualquier proceso patológico
- d) evitar al máximo la yatrogenia
- e) todas las anteriores.

3

Es una de las características principales del sangrado en el embarazo ectópico:

- a) no ceder a ningún tratamiento de no ser a la extirpación de la ecciesis
- b) ser irregular
- c) ser intermitente
- d) persistir en forma de goteo
- e) el aspecto de la sangre que es espesa y de color obscuro.

4

A la exploración ginecológica en el embarazo ectópico podemos encontrar en sus primeros estadios:

- a) palpación de una masa en el fondo uterino
- b) dolor al tacto en uno de los fondos laterales de la vagina
- c) cervix erosionado y edematoso
- d) retroflexión uterina
- e) tapón mucopurulento.

5

Embarazo en el que el feto crece dentro de la cavidad abdominal y la placenta permanece adherida a la trompa:

- a) abdominal secundario
- b) tuboabdominal
- c) tuboovárico
- d) interligamentario
- e) ovárico.

6

La decidua uterina en el embarazo ectópico es expulsada en fragmentos o en un solo molde por la siguiente razón:

- a) por aumento del trofoblasto funcionante
- b) por hipertonicidad uterina
- c) por soporte hormonal inadecuado
- d) por su acción de cuerpo extraño
- e) porque la placentación hemocorial degenera.

7

Factor causal asociado con la alta frecuencia del embarazo ectópico y niveles socioeconómicos bajos:

- a) genético
- b) inmunológico
- c) yatrogénico
- d) infeccioso
- e) hormonal.

8

Se considera como factor causal del embarazo ectópico que retarda o impide el tránsito del huevo fecundado:

- a) aglutinación de los pliegues de la mucosa tubárica
- b) capacidad nidatoria precoz del huevo fecundado
- c) endometriosis
- d) degeneración de la zona pelúcida
- e) desarrollo trofoblástico acelerado.

9

El embarazo ectópico abdominal puede ser:

- a) ampular
- b) superficial
- c) primitivo
- d) ístmico
- e) subcutáneo.

10

El embarazo tubario puede ser:

- a) superficial
- b) secundario
- c) intersticial
- d) primitivo
- e) profundo.

RESPUESTAS

10. c
9. c
8. a
7. d
6. c

5. b
4. b
3. a
2. e
1. a