

Embarazo ectópico

1

Es necesario hacer diagnóstico diferencial ante la sospecha de embarazo ectópico con las siguientes entidades, EXCEPTO:

- a) apendicitis aguda
- b) aborto
- c) pseudociosis
- d) quiste roto del cuerpo amarillo
- e) quiste con pedículo torcido.

2

El tratamiento quirúrgico del embarazo ectópico es:

- a) la salpinguectomía
- b) la salpingopexia
- c) la ligamentopexia
- d) la histerectomía
- e) dependiendo de las condiciones que se encuentren al abrir el vientre.

3

El dolor en el embarazo ectópico roto tiene la siguiente característica:

- a) no tener localización fija en el bajo vientre
- b) ser poco intenso
- c) puede corresponder o no al lado de la implantación anormal
- d) puede ser punzante
- e) se acompaña de lipotimia severa.

4

Como exploración accesoria para hacer el diagnóstico de embarazo ectópico está:

- a) la prueba de Rubin
- b) la histerosalpingografía
- c) la punción del fondo de saco de Douglas
- d) la urografía excretora
- e) la radiopelvimetría.

5

Las siguientes son características comunes a todo embarazo secundario, EXCEPTO:

- a) imposibilidad de parto espontáneo
- b) condición nutricional desfavorable para el huevo
- c) peligro para la vida de la madre
- d) las reacciones orgánicas maternas disminuyen en un 50 por ciento
- e) imposibilidad de parto por vía natural.

6

Si el producto muerto en el embarazo ectópico no se extrae, queda expuesto a:

- a) calcificarse
- b) momificarse
- c) maceración simple
- d) infectarse
- e) todo lo anterior.

7

La edad a la que es más frecuente el embarazo ectópico es:

- a) 15 a 20 años
- b) 20 a 25 años
- c) 25 a 35 años
- d) 35 a 40 años
- e) 40 a 45 años

8

Hablamos de nidación ectópica primaria cuando:

- a) el huevo se implanta en el primer segmento de la salpinge
- b) el huevo se implanta en el ovario
- c) el huevo se implanta en el primer sitio en el que se detiene
- d) la implantación se realiza en el primer día de la fecundación
- e) ninguna de las anteriores.

9

Se considera sitio normal de implantación del huevo fecundado:

- a) el endometrial
- b) el intersticial
- c) el cervical
- d) el miometrial
- e) todos los anteriores.

10

Según algunos reportes en México sobre la frecuencia del embarazo ectópico, se considera que hay:

- a) un ectópico por cada 100 embarazos
- b) un ectópico por cada 200 embarazos
- c) un ectópico por cada 300 embarazos
- d) un ectópico por cada 400 embarazos
- e) un ectópico por cada 500 embarazos.

RESPUESTAS

1. c
2. e
3. e
4. a
5. b
6. e
7. b
8. a
9. a
10. e

1. c
2. e
3. e
4. a
5. b
6. e
7. b
8. a
9. a
10. e