

## Litiasis de las vías urinarias

**1**  
La litiasis urinaria por oxalato de calcio y sin trastorno metabólico demostrable se trata con

- agua y alcalinos
- agua y óxido de magnesio
- alopurinol, líquidos y alcalinos
- dieta baja en calorías
- líquidos solamente

**2**  
La polaquiuria diurna y nocturna en sujeto joven sugiere

- pielonefritis
- glomerulonefritis
- litiasis renal
- tuberculosis
- estenosis uretral

**3**  
La secreción de hormona paratiroidea está controlada por

- el nivel de fósforo sérico
- el nivel de calcio sérico
- el nivel de calcio óseo
- el nivel de fósforo óseo
- todas las anteriores

**4**  
¿Cuál de las siguientes es causa de hipercalcemia?

- linfoma
- leucemia
- mixedema
- sarcoidosis
- todas las anteriores

**5**  
El síndrome de obstrucción de uretero por vena ovárica es a la altura de

- articulación sacrolumbar
- sacra 3
- lumbar 2
- lumbar 4
- dorsal 12

**6**  
El desarrollo de cálculos de xantina se lleva a cabo en orinas

- alcalinas
- turbias
- ácidas
- claras
- fétidas

**7**  
El mecanismo del cólico nefrítico en caso de litiasis ureteral es debido a

- ulceración del uréter
- edema del riñón
- ingurgitación sanguínea renal
- dilatación por estásis urinaria
- infección de la pelvicilla

**8**  
¿Cuál es la complicación más frecuente, en la retención urinaria completa?

- insuficiencia renal
- litiasis
- estallamiento
- tumores
- infección

**9**  
La litiasis renal antigua y completa produce en el riñón

- ureterectasia
- retención aguda de orina
- autonefrectomía
- globo vesical
- estenosis

**10**  
De los siguientes padecimientos, ¿cuál produce piuria estéril?

- tuberculosis renal
- pielonefritis
- cistitis intersticial
- cistitis traumática
- papilitis necrosante

### RESPUESTAS

1. e	5. a
2. d	6. a
3. b	7. d
4. e	8. e
5. c	9. c
6. a	10. a
7. d	
8. e	
9. c	
10. a	